左右594×天地350mm

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

# GC TISSUE CONDITIONER

TISSUE CONDITIONING AND RELINING MATERIAL

For use by or under the supervision of a dental professional in the recommended indications.

**RECOMMENDED INDICATIONS**
1. Tissue conditioning.
2. Temporary relining.
3. Functional impression taking.

**CONTRAINDICATIONS**
Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer, methacrylate polymer, ethanol or aliphatic acid ester-based plasticizer.

**DIRECTIONS FOR USE**
1. PREPARATION
   Check the patient's oral conditions and the denture in use. Adjust misfitting areas with a carbide bur, clean and dry. Create sufficient space so GC TISSUE CONDITIONER can be applied at a minimum thickness of 1 mm in order to maintain the elasticity. Apply COCOA BUTTER or petroleum jelly to the areas where the denture should not be relined.
2. POWDER /LIQUID DISPENSING
   The standard powder/liquid ratio is 2.4 g/2 mL (1 unit of powder to 2 units of liquid). Dispense the required amounts of powder and liquid into the rubber cup.
   Note :
   a) Using less liquid will result in a shorter gel phase and a more viscous mixture. More liquid will result in a longer gel phase and a less viscous mixture.
   b) Powder may form aggregates in the bottle under certain storage conditions. This will not affect the function.
   c) Close the bottles of powder, liquid and coating agent tightly immediately after use.
3. MIXING
   Mix powder and liquid for 30-60 seconds until the mixture reaches a creamy consistency.
4. APPLICATION
   1) The coating agent can be used as a bonding agent to improve the bond strength and to avoid possible delamination. Apply the coating agent with the brush only on the areas where a stronger bond is needed. In this case, GC TISSUE CONDITIONER cannot be peeled off by hand.
   2) Apply the mixture evenly to the fitting surfaces of the prepared denture.
      Note :
      a) To avoid sticking of the material, lubricate fingertips or instruments with water. Do not use lotion or petroleum jelly.
      b) Prevent excess from flowing into the throat.
   3) Seat the denture in the mouth. Ask the patient to gently occlude in the centric occlusion and move the lips and mandibles to shape the flange. After keeping the denture for about 5 minutes in this position, remove and inspect for excess and deficiencies.
   4) Remove any excess using a sharp instrument.
5. FINISHING
   1) Wash away saliva from the relined denture under running water. Dry with an air syringe.
   2) Apply the coating agent to the relined surfaces of the denture. Dry the coating agent thoroughly with an air syringe or leave it undisturbed for 4-5 minutes.
      Note :
      To improve the marginal seal, coating agent can also be applied to the GC TISSUE CONDITIONER / denture interface.
   3) Reseat the denture in the mouth.
      Note :
      a) Immersion of the denture in water before seating in the mouth will reduce unwanted odor.
      b) Instruct the patient to clean the relined areas with fingers under running water. The use of a brush may damage the relined areas. Care should be taken not to use denture cleaning agents for a prolonged period of time.
6. REMOVAL
   It is recommended to remove the material or replace it with a new one after a few days or weeks depending on each clinical case.
   GC TISSUE CONDITIONER can be peeled off by hand. Use a sharp instrument or bur to remove the area where the coating agent was used as a bonding agent.

**STORAGE**
Recommended for optimal performance, store in a cool, dark place (4-25°C) (39.2-77.0°F) away from direct sunlight and high temperature.

**COLORS**
Live pink, White

**PACKAGES**
1. 1-1 Package
   Kit contains: Powder 90g (1), Liquid 90g (101mL) (1),
   Coating agent 12g (15mL) (1), Powder measure (1), Plastic liquid syringe No.1 (1), Brush No.7 (1), Plastic spatula (1), Rubber cup (Large) (1)
2. Refill Packages
   a. GC TISSUE CONDITIONER powder 90g (in each shade)
   b. GC TISSUE CONDITIONER liquid 90g (101mL)
   c. GC TISSUE CONDITIONER coating agent 12g (15mL)

**CAUTION**
1. The liquid is flammable. Avoid sources of ignition. Do not keep or use near fire or high temperature.
2. Use in a well ventilated place. Replace cap immediately.
3. Avoid contact with eyes. In case of contact, immediately flush with water and seek medical attention.
4. Avoid direct contact of liquid, mixture or coating agent on skin. In case of contact, wipe with a cotton pellet or sponge soaked in alcohol and flush with water.
5. Coating agent may turn yellow with time, but this will not affect its function.
6. Do not mix with other products.
7. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
8. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING:
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 08/2019

MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasuzuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN JAPAN

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба. BG

# GC TISSUE CONDITIONER

ТЪКАНЕН КОНДИЦИОНЕР И РЕБАЗИРАЩ МАТЕРИАЛ

За употреба само от или под надзор на дентални професионалисти за препоръчаните индикации.

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ**
1. Кондициониране на тъканите.
2. Временно ребазиране.
3. Снемане на функционални отпечатъци.

**КОНТРАИНДИКАЦИИ**
*Избягвайте употребата на този продукт при пациенти с известни алергии към метакрилатен мономер, метакрилатен полимер, етанол или алифатна киселина.*

**НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА**
1. ПОДГОТОВКА
   Прегледайте устната кухина и протезите на пациента. Изгладете не засвидетелствани области с карбиден борер, почистете и подсушете. Осигурете достатъчно място, така че GC TISSUE CONDITIONER да се приложи с минимална дебелина 1 mm, за да се запази еластичността. Нанесете какаово масло или вазелин в областите, където протезата не трябва да се ребазира.
2. ДОЗИРАНЕ НА ПРАХ/ТЕЧНОСТ
   Стандартното съотношение прах: течност е 2,4 g / 2 mL (1 единица прах към 2 единици течност). Дозирайте необходимото количество прах и течност в гумената чашка.
   Забележка :
   a) Използването на по-малко течност ще доведе до по-къса гел фаза и по-вискозна смес. Повече течност ще доведе до по-дълга гел фаза и по-малко вискозна смес.
   b) Прахът може да образува агрегати в бутилката при определени условия на съхранение. Това няма да се отрази на функцията.
   c) Затворете бутилките на праха, течността и покривния агент, веднага след употреба.
3. СМЕСВАНЕ
   Смесете праха и течността в продължение на 30-60 секунди, докато сместа добие кремообразна консистенция.
4. НАНАСЯНЕ
   1) Покривният агент може да бъде използван като свързващ агент, за да повиши сцепната на свързване и за да се избегне възможно разслояване. Нанасяйте покривния агент с четка, само в областите, където е необходимо по-силна връзка. В този случай, GC TISSUE CONDITIONER не може да бъде отстранен с ръка.
   2) Нанесете равномерно сместа върху съответните повърхности на подготвената протеза.
      Забележка :
      a) За да избегнете полепване на материала, навлажнете пръстите или инструментите с вода. Не използвайте крем или вазелин.
      b) Предотвратете изтичането на излишния материал към гърлото.
   3) Поставете протезата в устата. Накарайте пациента да затвори леко в централна оклузия, докато да раздалечи устните и бузите, да оформи мускулите. След задържане на протезата за около 5 минути в тази позиция, я извадете и отстранете за евентуални излишъци и недостатъци.
   4) Отстранете излишъците, използвайки остър инструмент.
5. ФИНИРАНЕ
   1) Измийте слюнката от ребазираната протеза с течаща вода. Подсушете с въздушна струя.
   2) Нанесете покривния агент върху ребазираните повърхности на протезата. Подсушете обилно с въздушна струя и оставете необезпокоявана за 4 - 5 минути.
      Забележка :
      За да се подобри запечатването на границите, покривният агент може да се нанесе на границата GC TISSUE CONDITIONER / протеза.
   3) Поставете протеза обратно в устата.
      Забележка :
      a) Потапянето на протезата във вода преди поставянето в устата ще намали нежеланата миризма.
      b) Инструктирайте пациента, да почиства ребазираните области с пръст под течаща вода. Употребата на четка може да увреди ребазираните области. Трябва да се внимава, да не се използват агенти за почистване на протези за продължителен период от време.
6. ОТСТРАНЯВАНЕ
   Препоръчва се, да се отстрани материала или да се подмени с нов, след няколко дни или седмици, в зависимост от конкретна клинична случай. GC TISSUE CONDITIONER може да се обели с ръка. Използвайте остър инструмент или борер, за да отстраните от участката, където е използван покривния агент, като свързващ агент.

**СЪХРАНЕНИЕ**
За оптимални резултати се препоръчва съхраняване на хладно, тъмно място (4-25°C) (39,2-77,0°F), далеч от пряка слънчева светлина и висока температура.

**ЦВЕТОВЕ**
Естествено розов, Бял

**ОПАКОВКИ**
1. 1-1 Опаковка
   Комплекта съдържа: Прах 90g (1), Течност 90g (101mL) (1), Покривен агент 12g (15mL) (1), Дозатор за праха (1), Пластмасова спринцовка за течността No.1 (1), Четка No.7 (1), Пластмасова шпатула (1), Гумена чашка (Голяма) (1)
2. Опаковки за допълване
   a. GC TISSUE CONDITIONER прах 90g (от всеки цвят)
   b. GC TISSUE CONDITIONER течност 90g (101mL)
   c. GC TISSUE CONDITIONER покривен агент 12g (15mL)

**ВНИМАНИЕ**
1. Течността е възпламенима. Избягвайте източници на искри. Не държте в близост с огън или високи температури.
2. Използвайте в добре проветрено място. Затворете капачката веднага.
3. Избягвайте контакт с очите. В случай на контакт, незабавно промийте с вода и потърсете лекарска помощ.
4. Избягвайте директен контакт на течността, сместа или покривния агент с кожата. В случай на контакт, изтрийте с памучен тупфер или гъбичка, напоена в алкохол и промийте с вода.
5. Покривния агент може да пожълтее с времето, но това няма да наруши неговата функция.
6. Не смесвайте с други продукти.
7. В редки случаи, продуктът може да предизвика сърбящ/чувствителност у някои хора. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.
8. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъда определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните листове за безопасност, налични на:
http://www.gceurope.com
Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.
Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е увредено. НЕ ОБЕЗВРЕДЯВАЙТЕ. Почистете цяло добре устройството, за да се гарантира изсъхване и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекциите средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

Докладване на нежелани ефекти:
Ако узнаете за някакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, включително от употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за бдителност, като изберете подходящия орган във вашата страна достъпен чрез следната връзка:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
както и на нашата система за вътрешна бдителност: vigilance@gc.dental
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 08/2019

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. CS

# GC TISSUE CONDITIONER

MATERIÁL K OŠETŘENÍ TKÁNÍ A PODKLÁDÁNÍ

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

**DOPORUČENÉ INDIKACE**
1. Ošetření tkání.
2. Dočasné podložení.
3. Snímání funkčního otisku.

**KONTRAINDIKACE**
Nepoužívejte tento produkt u pacientů se známou alergií na metakrylátový monomér, metakrylátový polymér, etanol nebo změkčovadla na bázi esteru alifatické kyseliny.

**NÁVOD K POUŽITÍ**
1. PREPARACE
   Zkontrolujte stav ústní dutiny pacienta a používané náhrady. Karbidním svrtidlem upravte pomocí karbidové frézy, vyčistěte a osušte. Vytvořte dostatek prostoru, aby bylo možné nanést GC TISSUE CONDITIONER ve vrstvě silné minimálně 1 mm pro zachování elasticity.
   Na místa, kde náhradu nelze podložit, naneste kakaové máslo nebo vazelínu.
2. DÁVKOVÁNÍ PRÁŠKU / TEKUTINY
   Standardní poměr prášek / tekutina je 2,4 g / 2 mL (1 jednotka prášku na 2 jednotky tekutiny). Potřebné množství prášku a tekutiny odměřte do gumové nádobky.
   Poznámka :
   a) Pokud použijete méně tekutiny, gelová fáze se zkrátí a směs bude viskóznější. Více tekutiny bude mít za následek delší gelovou fázi a méně viskózní směs.
   b) Za určitých skladovacích podmínek může prášek v lahvičce vytvářet shluky. Na funkci to však nemá žádný vliv.
   c) Lahvičky s práškem, tekutinou a nátěrovým činidlem ihned po použití uzavřete.
3. MÍCHÁNÍ
   Prášek s tekutinou míchejte 30-60 sekund, dokud směs nezíská krémovou konzistenci.
4. APLIKACE
   1) Nátěrové činidlo lze použít jako bondovací činidlo ke zlepšení vazební síly a zabránění případnému štěpení. Na místa, kde je potřeba silnější vazba, nanášejte nátěrové činidlo pomocí štětce. V takovém případě nelze GC TISSUE CONDITIONER odloupnout ručně.
   2) Směs rovnoměrně nanášejte na vhodné povrchy připravované náhrady.
      Poznámka :
      a) Aby materiál nelepil, navlhčete konečky prstů nebo nástroje vodou. Nepoužívejte přetřovou vodu ani vazelínu.
      b) Dbejte, aby nadbytečný materiál nezatékal do krku.
   3) Vložte náhradu do úst. Požádejte pacienta, aby jemně skousnul v centrální okluzi a pohyboval rtů a čelistí napnutí svaly. Ponechejte protézu v této pozici asi 5 minut, poté ji vyjměte a zkontrolujte přebytky a nedostatky.
   4) Veškeré přebytky odstraňte pomocí ostrého nástroje.
5. DOKONČOVÁNÍ
   1) Tekoucí vodou opláchněte sliny z podkládané protézy. Osušte vzduchovou stříkačkou.
   2) Nátěrové činidlo naneste na podkládané povrchy protézy. Poté činidlo pečlivě osušte vzduchovou stříkačkou, případně ponechte cca 4-5 minut působit.
      Poznámka :
      Pro zlepšení okrajového těsnění lze nátěrové činidlo nanést na rozhraní GC TISSUE CONDITIONER / náhrada.
   3) Náhradu znovu vložte do úst.
      Poznámka :
      a) Nežádoucí pach eliminujete, pokud náhradu před vložením do úst ponoříte do vody.
      b) Použité činidlo, ale odstraňujte místa omývají prsty pod tekoucí vodou. Použití kartáčku by mohlo podkládaná místa poškodit. Vyhněte se třeba dlouhodobému používání čisticích prostředků.

**SKLADOVÁNÍ**
Pro dosažení optimálního výsledku skladujte na chladném, tmavém místě (4-25°C) (39,2-77,0°F) a chraňte před přímým slunečním zářením a vysokými teplotami.

**BARVY**
Živoucí růžová, Bílá

**BALENÍ**
1. Balení 1-1
   Sada obsahuje: Prášek 90 g (1), tekutinu 90 g (101 mL) (1), nátěrové činidlo 12 g (15 mL) (1), odměrku na prášek (1), plastovou stříkačku na tekutinu č. (1), kartáček č. 7 (1), plastovou špachtli (1), gumovou nádobku (velkou) (1)
2. Náhradní balení
   a. GC TISSUE CONDITIONER prášek 90 g (v každém z odstínů)
   b. GC TISSUE CONDITIONER tekutina 90 g (101 mL)
   c. GC TISSUE CONDITIONER nátěrové činidlo 12 g (15 mL)

**UPOZORNĚNÍ**
1. Tekutina je hořlavá. Uchovávejte mimo zdrojů vznícení. Neuchovávejte ani nepoužívejte v blízkosti ohně nebo při vysokých teplotách.
2. Používejte na dobře větraném místě. Ihned znovu uzavřete.
3. Vyhněte se kontaktu s očima. V případě zasažení očí vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
4. Vyhněte se přímému kontaktu tekutiny, namíchané směsi nebo nátěrového činidla s pokožkou. V případě zasažení utřete vatovým tampónem nebo houbičkou namočenou v alkoholu a opláchněte vodou.
5. Nátěrové činidlo může časem zežloutnout, na jeho funkci to však nemá vliv.
6. Nemíchejte s jinými výrobky.
7. V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře.
8. Při práci vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, obličejové masky a ochranné brýle.

Některé výrobky, které jsou uvedené v návodu k použití, mohou být klasifikovány jako nebezpečné podle GHS. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese:
http://www.gceurope.com
Můžete je také získat u svého dodavatele.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:
OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi pacienty, vyžadují tyto dávkovací systémy střední úroveň dezinfekce. Ihned po použití zkontrolujte a označte v případě pochybností. Znehodnocené zařízení zlikvidujte. NEPONOŘUJTE. Aby nedocházelo k zaschnutí a hromadění nečistot, důkladně očistěte dávkovací systém. Dezinfikujte produktem registrovaným pro střední úroveň dezinfekce dle místních zdravotních předpisů.

Hlášení nežádoucích účinků:
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či podobných událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznámte to přímo prostřednictvím příslušného systému hlášení nežádoucích účinků patřičnému úřadu ve vaší zemi, který je přístupný v následujícím odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí: vigilance@gc.dental
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Poslední upravení: 08/2019

Prije uporabe pažljivo pročitati upute za uporabu. HR

# GC TISSUE CONDITIONER

MATERIJAL ZA KONDICIONIRANJE TKIVA I PODLAGANJE PROTEZA

Samo za stručnu stomatološku uporabu u preporučenim indikacijama.

**PREPORUČENE INDIKACIJE**
1. Kondicioniranje tkiva.
2. Privremeno podlaganje proteza.
3. Uzimanje funkcijskog otiska.

**KONTRAINDIKACIJE**
Izbjegći korištenje ovog proizvoda kod pacijenata s poznatim alergijama na metakrilatni monomer, metakrilatni polimer, etanol ili alifatske kiseline na bazi estar plastifikatora.

**UPUTE ZA UPORABU**
1. PRIPREMA
   Provjeriti oralno stanje pacijenta i proteze koju koristi. Karbidnim svrdlom prilagoditi područja koja dobro ne pristaju, očistiti i osušiti. Ostaviti dovoljno prostora za nanošenje materijala GC TISSUE CONDITIONER u sloju minimalne debljine 1 mm kako bi se održala elastičnost.
   Na mjesta gdje ne treba podlagati protezu nanijeti kakao maslac ili vazelin.
2. DOZIRANJE PRAŠKA I TEKUĆINE
   Standardni omjer praška / tekućine iznosi 2,4 g / 2 mL (1 jedinica praška na 2 jedinice tekućine). Potrebne količine praška i tekućine dozirati u gumenu čašu.
   Važno :
   a) Doziranje manje tekućine uzrokovat će kraću fazu gelaste konzistencije i viskozniju miješavinu. Više tekućine uzrokovat će dužu fazu gelaste konzistencije i manje viskoznu miješavinu.
   b) U boci se praška, tekućine i sredstva za premaz čvrsto zatvoriti odmah nakon uporabe.
3. MIJEŠANJE
   Prašak s tekućinu miješati 30-60 sekundi dok miješavina ne postane kremasta.
4. APLIKACIJA
   1) Nátěrové činidlo lze použít jako bondovací činidlo ke zlepšení vazební síly a zabránění případnému štěpení. Na místa, kde je potřeba silnější vazba, nanášejte nátěrové činidlo pomocí štětce. V takovém případě nelze GC TISSUE CONDITIONER odloupnout ručně.
   2) Směs rovnoměrno nanijeti na vlažne površine pripremljene proteze.
      Važno :
      a) Kako bi se izbjeglo ljepljenje materijala, vrhova prstiju ili instrumenata vlaži navlaživši vodom. Ne koristiti losion ili vazelin.
      b) Paziti da se višak ne slije u grlo.
   3) Protezu postaviti u usta. Pacijenta zamoliti da nježno zatvori usta u centričnoj okluziji i pomiče usnice i jezik kako bi je oblikovao mišićima. Protezu držati u tom položaju 5 minuta, skinuti je i provjeriti ima li viška materijala i nedostataka.
   4) Oštrim instrumentom ukloniti višak materijala.
5. ZAVRŠNA OBRADA
   1) Pod tekućom vodom ostraniti slinu iz podložene proteze. Osušiti puhanjem zraka.
   2) Nanijeti sredstvo za premaz na podložene površine proteze. Sredstvo za premaz temeljito osušiti puhanjem zraka ili ostaviti stajati 4-5 minuta.
      Važno :
      Za poboljšanje rubnog prianjanja sredstvo za premaz također se može nanijeti na spoj sredstva GC TISSUE CONDITIONER / proteze.
   3) Protezu ponovno postaviti u usta.
      Važno :
      a) Uranjanje proteze u vodu prije postavljanja u usta smanjit će neugodan miris.
      b) Pacijentu pokazati kako se pristina pod tekućom vodom čiste područja podvrgnuta. Korištenje četkice može oštetiti podložena područja. Valja paziti da se sredstva za čišćenje proteze ne koriste duže vrijeme.

**SKLADIŠTENJE**
Čuvajte se treba dbati na to, ža bi se optimalni rezultati postigli, čuvajte ih na hladnom i tamnom mjestu (4-25°C) daleko od izravne sunčeve svjetlosti i visoke temperature.

**BOJE**
Žarko roza, bijela

**PAKIRANJA**
1. 1-1 pakiranje
   Komplet sadrži: prašak 90 g (1), tekućina 90 g (101 mL) (1), Sredstvo za premaz 12 g (15 mL) (1), mjerica za prašak (1), plastična štrcaljka za tekućinu br. 1 (1), kist br. 7 (1), plastična špatula (1), gumena čaša (velika) (1)
2. Pakiranje za nadopunu
   a. GC TISSUE CONDITIONER prašak 90 g (u svakoj boji)
   b. GC TISSUE CONDITIONER tekućina 90 g (101 mL)
   c. GC TISSUE CONDITIONER sredstvo za premaz 12 g (15 mL)

**UPOZORENJE**
1. Tekućina je zapaljiva. Izbjegavati izvore paljenja. Ne čuvati niti koristiti u blizini vatre ili visoke temperature.
2. Koristiti u dobro provjetrenom prostoru. Odmah natrag poklopiti.
3. Izbjegavati dodir s očima. U slučaju dodira, odmah isprati vodom i potražiti liječnika.
4. Izbjegavati direktni dodir tekućine, miješavine ili sredstva za premaz s kožom. U slučaju dodira obrisati komadićem vate ili spužvicom namočenom u alkohol i isprati vodom.
5. Sredstvo za premaz može s vremenom požutjeti, no to ne utječe na funkciju.
6. Ne miješati s drugim proizvodima.
7. U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može uzrokovati osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije valja prekinuti s uporabom proizvoda i obratiti se liječniku.
8. Osobna zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za oči, treba uvijek nositi.

Neki proizvodi spomenuti u ovoj Uputi za uporabu mogu se klasificirati kao opasni prema GHS. Uvijek provjerite u sigurnosno tehničkom listu na:
http://www.gceurope.com
Također se mogu zatražiti od vašeg dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo onečišćenje između pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakiranja zahtijevaju dezinfekciju srednje razine. Odmah nakon uporabe pregledati višekratno upotrebljivo pakiranje i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećeno napravu odbaciti. NE URANJATI U TEKUĆE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito očistiti višekratno upotrebljivo pakiranje kako bi se spriječilo sušenje i nakupljanje onečišćenja. Dezinficirati sredstvom za dezinfekciju srednje razine prema registriranu zdravstveno-infektivnoj kontroli sukladno regionalno / nacionalnim smjernicama.

Izvješćivanje o neželjenim učincima:
Ako postanete svjesni bilo kakvih neželjenih učinaka, reakcija ili sličnih događaja bilo kojih bilo uporabom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sustav nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sljedeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj ćete način doprinijeti poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Zadnje izdanje: 08/2019

Használat előtt az útmutatót olvassa el figyelmesen! HU

# GC TISSUE CONDITIONER

NYÁLKAHÁRTYA-EDZŐ ÉS ALÁBÉLELŐ ANYAG

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk a megadott felhasználási területen.

**AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET**
1. Nyálkahártya kondicionálása
2. Ideiglenes alábélelése
3. Funkcionális lenyomatvétel

**ELLENJAVALLATOK**
Kerülje a termék használatát metakrilát monomerekre, -polimerekre, etanol vagy alifatikus sav-alifatycznego plasztikáló szerekre érzékeny páciensek esetében.

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**
1. ELŐKÉSZÍTÉS
   Ellenőrizze páciense szájüregi állapotát és a jelenleg használt műfogsort. A rosszul illeszkedő területeket igazítsa meg gyémántfúró segítségével. Hagyjon elegendő helyet a GC TISSUE CONDITIONER számára, melyet a rugalmasság biztosításának érdekében min. 1mm vastag rétegben vigyen fel.
   Azokra a területekre, melyeknél alábélelés nem szükséges, vigyen fel kakaóvajat vagy petróleumzselét.
2. A POR ÉS A FOLYADÉK KIADAGOLÁSA
   Az irányadó por/folyadék arány 2,4g / 2mL (1 egység por és 2 egység folyadék kerekítve). Adagolja a kívánt mennyiségű port és folyadékot a gumicsészébe.
   Megjegyzés :
   a) Kevesebb folyadék használatával rövidebb zseléfázist és magasabb viszkozitású folyadékot érhet el.
   b) Bizonyos tárolási körülmények esetén a por a folyadékkal elegyítve összecsomósodhat. Ez a funkcionalitást nem befolyásolja.
   c) Használat után a por, folyadék és a fedőkbe üvegelt jól zárja vissza.
3. KEVERÉS
   Keverje a port és a folyadékot 30-60 másodpercen keresztül a kívánt konzisztencia eléréséig.
4. APPLIKÁLÁS
   1) A fedőlakk használható bondanyagként is a rögzítés erősségének növelésére és az esetleges leválás elkerülésére. Kizárólag az ecset segítségével vigye fel a fedőlakkot az erősebb rögzítést igénylő felületekre. Ebben az esetben a GC TISSUE CONDITIONER nem választható le kézzel.
   2) Egyenletesen vigye fel a keveréket a fogsor illeszkedő részeire.
      Megjegyzés :
      a) Hogy elkerülje az anyag tapadását, vizezze be az ujjvégeit és a használt eszközöket. Ne használjon krémet vagy petróleumzselét.
      b) Ügyeljen rá, hogy a felesleg ne folyhasson a torkán keresztül.
   3) Helyezze a fogsort a szájba. Kérje páciensét, hogy központi helyzetben gyengén harapjon rá, állkapcsait és ajkait zárja össze. Hagyja a fogsort 5, 5 percig ebben a pozícióban, ezután távolítsa el és vizsgálja meg azokat a területeket, ahol felesleg vagy hiány mutatkozik.
   4) Távolítsa el a felesleget egy éles eszközzel.
5. FINIROZÁS
   1) Folyó víz alatt mossa le a nyálat az alábélelt fogsorról. Légárammal szárítsa meg.
   2) Vigye fel a fedőlakkot a fogsor alábélelt felszíneire. Légárammal alaposan szárítsa meg, vagy hagyja érintetlenül 4-5 percig.
      Megjegyzés :
      A szél zárás tökéletesítésére a fedőlakk a GC TISSUE CONDITIONER és a fogsor találkozásához is felvihető.
   3) Helyezze vissza a fogsort a szájba.
      Megjegyzés :
      a) A fogsor behelyezés előtti vízbe mártásával csökkenthető a kellemetlen szagokat.
      b) Kérje meg páciensét, hogy a fogsor alábélelt részeit folyó víz alatt csak ujjaival tisztítsa. A kefével való tisztítás megsértheti az alábélelt területeket. Ügyeljen arra is, hogy ne használjon hosszabb ideig fogsortisztító anyagokat.

**SKLADOVÁNÍ**
Pro dosažení optimálního výsledku skladujte na chladném, tmavém místě (4-25°C) (39,2-77,0°F) a chraňte před přímým slunečním zářením a vysokými teplotami.

**BARVY**
Živoucí růžová, Bílá

**BALENÍ**
1. Balení 1-1
   Sada obsahuje: Prášek 90 g (1), tekutinu 90 g (101 mL) (1), nátěrové činidlo 12 g (15 mL) (1), odměrku na prášek (1), plastovou stříkačku na tekutinu č. (1), kartáček č. 7 (1), plastovou špachtli (1), gumovou nádobku (velkou) (1)
2. Náhradní balení
   a. GC TISSUE CONDITIONER prášek 90 g (v každém z odstínů)
   b. GC TISSUE CONDITIONER tekutina 90 g (101 mL)
   c. GC TISSUE CONDITIONER nátěrové činidlo 12 g (15 mL)

**UPOZORNĚNÍ**
1. Tekutina je hořlavá. Uchovávejte mimo zdrojů vznícení. Neuchovávejte ani nepoužívejte v blízkosti ohně nebo při vysokých teplotách.
2. Používejte na dobře větraném místě. Ihned znovu uzavřete.
3. Vyhněte se kontaktu s očima. V případě zasažení očí vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
4. Vyhněte se přímému kontaktu tekutiny, namíchané směsi nebo nátěrového činidla s pokožkou. V případě zasažení utřete vatovým tampónem nebo houbičkou namočenou v alkoholu a opláchněte vodou.
5. Nátěrové činidlo může časem zežloutnout, na jeho funkci to však nemá vliv.
6. Nemíchejte s jinými výrobky.
7. V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře.
8. Při práci vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, obličejové masky a ochranné brýle.

Některé výrobky, které jsou uvedené v návodu k použití, mohou být klasifikovány jako nebezpečné podle GHS. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese:
http://www.gceurope.com
Můžete je také získat u svého dodavatele.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:
OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi pacienty, vyžadují tyto dávkovací systémy střední úroveň dezinfekce. Ihned po použití zkontrolujte a označte v případě pochybností. Znehodnocené zařízení zlikvidujte. NEPONOŘUJTE. Aby nedocházelo k zaschnutí a hromadění nečistot, důkladně očistěte dávkovací systém. Dezinfikujte produktem registrovaným pro střední úroveň dezinfekce dle místních zdravotních předpisů.

Hlášení nežádoucích účinků:
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či podobných událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznámte to přímo prostřednictvím příslušného systému hlášení nežádoucích účinků patřičnému úřadu ve vaší zemi, který je přístupný v následujícím odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí: vigilance@gc.dental
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Poslednje upravené: 08/2019

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję stosowania. PL

# GC TISSUE CONDITIONER

MATERIAŁ DO REGENERACJI TKANKI I PODŚCIELANIA

Wyłącznie do stosowania przez lekarza dentystę według zalecanych wskazań.

**WSKAZANIA**
1. Regeneracja tkanki
2. Tymczasowe podścielanie
3. Pobieranie wycisków czynnościowych

**PRZECIWWSKAZANIA**
Unikać stosowania tego produktu u pacjentów z rozpoznaną alergią na monomer metakrylowany, polimer metakrylanu, etanol lub plastyfikator na bazie estru kwasu alifatycznego.

**INSTRUKCJA STOSOWANIA**
1. PRZYGOTOWANIE
   Sprawdzić warunki w jamie ustnej pacjenta i używaną protezę. Powierzchnie przeznaczone do podścielenia oszlifować wiertłem z węglika, oczyścić i wysuszyć. Przygotować odpowiednią ilość miejsca, aby GC TISSUE CONDITIONER nałożony warstwą grubości minimum 1 mm zachował elastyczność.
   Powierzchnie protezy nie przewidziane do podścielania pokryć maśłem kakaowym lub wazeliną.
2. DOZOWANIE PROSZKU I PŁYNU
   Standardowy stosunek proszku do płynu wynosi 2,4 g / 2 mL (1 jednostka proszku na 2 jednostki płynu). Odmierzyć wymagane ilości proszku i płynu do gumowego tygielka.
   Uwaga :
   a) Użycie mniejszej ilości płynu spowoduje krótszą fazę żelu i bardziej lepką mieszaninę. Więcej płynu wydłuży fazę żelu i zmniejszy lepkość mieszaniny.
   b) W niektórych warunkach przechowywania proszek może tworzyć w butelce grudki. Nie wpłynie to na jego przydatność.
   c) Butelki z proszkiem, płynem i środkiem do powlekania po użyciu szczelnie zamykać.
3. MIESZANIE
   Proszek i płyn mieszać przez 30-60 sekund do uzyskania przez mieszaninę konsystencji kremu.
4. APLIKACJA
   1) Środek powlekający można zastosować jako czynnik łączący w celu uzyskania lepszej siły połączenia i uniknięcia ewentualnego rozwarstwienia. Środek powlekający nakładać pędzelkiem wyłko na te miejsca, gdzie wymagane jest silniejsze połączenie, ponieważ GC TISSUE CONDITIONER nie da się później ręcznie usunąć.
   2) Zmieszany materiał nakładać równomiernie na regenerowane powierzchnie przygotowanej protezy.
      Uwa

左右594×天地350mm

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. SK

# GC TISSUE CONDITIONER

MATERIÁL NA OŠETRENIE TKANIVA A PODKLADANIE

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

**DOPORUČENÉ INDIKÁCIE**
1. Obetrenie tkaniva.
2. Dočasné podloženie.
3. Snímanie funkčných odtlačkov.

**KONTRAINDIKÁCIE**
Nepoužívajte tento produkt u pacientov so známou alergiou na metakrylátový monomér, metakrylátový polymér, etanol alebo zmäkčovadlá na báze esteru alifatickej kyseliny.

**NÁVOD NA POUŽITIE**
1. PREPARÁCIA
Skontrolujte stav ústnej dutiny pacienta a používaného umelého chrupu. Nerovné miesta upravte pomocou karbidovej vŕtačky vt. vyčistite a osušte. Vytvorte dostatočný priestor na to, aby bolo možné nanášať GC TISSUE CONDITIONER vo vrstve najmenej 1 mm, kvôli zachovaniu elasticity. Miesta, kde protézu nie je možné podložiť, natrite kakaovým maslom alebo vazelínou.
2. DÁVKOVANIE PRÁŠKU / TEKUTINY
Štandardný pomer prášok / tekutina je 2,4 g/2 mL (1 jednotka prášku na 2 jednotky tekutiny). Potrebné množstvo prášku a tekutiny odmerajte do gumovej nádobky.
Poznámka:
a) Použitie menšieho množstva tekutiny bude mať za následok skrátenie gélovej fázy a väčšiu viskozitu zmesi. Po použití väčšieho množstva tekutiny bude gélová fáza dlhšia a zmes bude menej viskózna.
b) Pri určitých skladovacích podmienkach môže prášok vo fľaštičke vytvárať zhluky. Nijako to však neovplyvňuje jeho funkciu.
c) Fľaše s práškom, tekutinou a náterovým činidlom ihneď po použití pevne uzatvorte.
3. MIEŠANIE
Prášok s tekutinou miešajte 30–60 sekúnd, kým zmes nezíska krémovú konzistenciu.
4. APLIKÁCIA
1) Náterové činidlo možno použiť ako bondovacie činidlo na posilnenie väzby a na zabránenie prípadnému štiepeniu. Náterové činidlo nanášajte štetcom len na tie miesta, kde je potrebná silnejšia väzba. Takom prípade nie je možné odlúpnuť GC TISSUE CONDITIONER ručne.
2) Zmes rovnomerne naneste na vhodné povrchy preparovanej protézy.
Poznámka :
a) Aby sa materiál nelepil, končeky prstov alebo nástroje navlhčite vodou, nepoužívajte piteľovú vodu ani vazelínu.
b) Dbajte, aby nadbytočný materiál nezatekal do hrdla.
3) Vložte protézu do úst. Prostredníctvom pacienta, aby jemne stryzol v centrálnej oklúzii a pohybom pier a čeľustí napol svaly. Ponechajte chrup v tejto polozi 5 minút, potom ho vyberte a skontrolujte prebytky a nedostatky.
4) Prebytky odstráňte pomocou ostrého nástroja.
5. KONEČNÉ ORPACOVANIE
1) Pod tekúcou vodou zmyte z podkladanej protézy sliny. Osušte vzduchovou striekačkou.
2) Na podkladanej protézy naneste náterové činidlo. Náterové činidlo dôkladne osušte vzduchovou striekačkou alebo nechajte 4-5 minút pôsobiť.
Poznámka :
Pre lepšie okrajové tesnenie možno náterové činidlo použiť aj na rozhraní GC TISSUE CONDITIONER / protéza.
3) Protézu znova vložte do úst.
Poznámka :
a) Nežiaducemu zápachu zabránite, ak protézu pred vložením do úst dôkladne opláchnete.
b) Použite pacientu, že podložené miesta musí čistiť prstami pod tekúcou vodou. Použitie kefky by mohlo podložené miesta poškodiť. Treba ďať pozor na to, že dlhší čas sa nesmú používať prostriedky na čistenie chrupu.
6. ODSTRÁNENIE
Odstrániť materiál, prípadne ho nahradiť novým sa odporúča o niekoľko dní až týždňov, v závislosti na konkrétnom klinickom prípade. GC TISSUE CONDITIONER možno odlúpnuť ručne.
Na vyhatie oblasti, kde bolo náterové činidlo použité ako bondovacie, použite ostrý nástroj alebo frézu.

**USKLADNENIE**
Pre zachovanie optimálnych vlastností skladujte na chladnom, tmavom mieste (4-25°C) (39,2-77,0°F) a chráňte pred priamym slnečným žiarením a vysokými teplotami.

**FARBY**
Živá ružová, biela

**BALENIA**
1. Balenie 1-1
Súprava obsahuje: prášok 90 g (1), tekutinu 90 g (101 mL) (1), náterové činidlo 12 g (15 mL) (1), odmerku na prášok (1), náterovú striekačku na tekutinu č. 1 (1), kefku č. 7 (1), plastovú špachtľu (1), gumovú nádobku (veľkú) (1)
2. Náhradné Balenie
a. GC TISSUE CONDITIONER prášok 90 g (vo všetkých odtieňoch)
b. GC TISSUE CONDITIONER tekutina 90 g (101 mL)
c. GC TISSUE CONDITIONER náterové činidlo 12 g (15 mL)

**UPOZORNENIE**
1. Tekutina je horľavá. Uchovávajte mimo dosahu priamych zdrojov zapálenia. Nepoužívajte ani nepoužívajte v blízkosti ohňa alebo vysokých teplôt.
2. Používajte na dobre vetranom mieste. Ihneď znovu uzatvorte.
3. Vyhýbajte sa kontaktu s očami. V prípade zasiahnutia ihneď vyplachnite vodou a vyhľadajte lekára.
4. Vyhýbajte sa kontaktu tekutiny, zmesi alebo náterového činidla s pokožkou. V prípade zasiahnutia pokožky zotrite vatou alebo špongiou namočenou v alkohole a opláchnite vodou.
5. Náterové činidlo môže s postupom času zoždrsnť, na jeho funkciu to však nemá vplyv.
6. Nemiešajte s inými výrobkami.
7. V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.
8. Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.

Niektoré výrobky uvádzané v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adrese:
http://www.gceurope.com
Môžete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA:
DÁVKOVACIE SYTÉMY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientami vyčaujú tieto dávkovacie systémy stredníu - úroveň dezinfekcie. Ihneď po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štítok poškodený. V prípade poškodenia, ho ihneď zlikvidujte. NEPONÁRAJTE DO TEKUTÍN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vysýchaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfekčné s registrovanými zdravotnými prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národných smerniciach.

Hlásenie nežiaducich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadaním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené: 08/2019

Pred uporabo previdno preberite navodila za uporabo. SL

# GC TISSUE CONDITIONER

MATERIAL ZA TKIVNO KONDICIONIRANJE IN PODLAGANJE

Uporaba samo za profesionalne namene in za pripročene indikacije.

**PRIPOROČENE INDIKACIJE**
1. Tkivno kondicioniranje.
2. Začasno podlaganje.
3. Funkcijsko odtiskovanje.

**KONTRAINDIKACIJE**
Izogibajte se uporabi tega proizvoda pri pacientih z znano alergijo na metakrilatne monomer, metakrilatni polimer, etanol ali alifatske kiseline na basi estrov alifatskeg kyseliny.

**NAVODILA ZA UPORABO**
1. PRIPRAVA
Preverite pacientovo stanje v ustih in stanje proteze, ki jo uporablja. Prilagodite potrebno podrocje s karbidnim svedrom, očistite in osušite. Ustvarite dovolj prostora, da boste lahko nanesli GC TISSUE CONDITIONER v sloju debelem minimalno 1mm kako bi se odrzala elastičnost.
Nanesite COCOA BUTTER ali petrolejev želé na podrocja proteze, ki jih ne želite podložiti.
2. RAZDELJEVANJE PRAHU / TEKOČINE
Standardno razmerje prah / tekočina je 2,4 g/2 mL (1 enota prahu in dve enoti tekočine). Razdelite ustrezni količini prahu in tekočine v gumijasti posodi.
Navodilo :
a) Če uporabite manj tekočine, bo gel faza krajša in mešanica bo bolj viskozna. Če uporabite več tekočine, pa bo gel faza daljša in mešanica bo manj viskozna.
b) Prah lahko pod določenimi pogoji shranjevanja tvori agregate. To ne vpliva na funkcijo.
c) Takoj po kontaki uporabi tesno zaprite stekleničke s prahom, tekočino in sredstvom za premaz.
3. MEŠANJE
Prah i tekočino mešajte 30 – 60 sekund, dokler mešanica ne postane kremasta.
4. NANOŠENJE
1) Sredstvo za premaz može se koristiti kao sredstvo za spajanje za pobočjanje čvrstoće spoja i izbegavanje odvajanja sloja. Sredstvo za premaz naneti četkicom samo na područja gde je potreban čvršći spoj. U tom slučaju GC TISSUE CONDITIONER ne može se odstraniti rukom.
2) Mešavinu ravnomerno naneti na površine za prijanjanje prepariane proteze.
Važno :
a) Kako bi se izbeglo lepljenje materijala, vrhova prstiju ili instrumenata treba navlažiti vodom. Ne koristiti losion ili vazelin.
b) Paziti da se materijal ne slije u grlo.
3) Protezu postaviti u usta. Pacijentu zamoliti da nežno zatvori usta u centričnoj okluziji i ponese usne i obrazi vilicu kako bi je oblikovao mišićima. Protezu držati u tom položaju 5 minuta, skinuti je i proveriti ima li viška materijala ili nedostatka.
4) Odstrim instrumentom odstraniti višak materijala.
5. ZAVRŠNA OBRADA
1) Pod tečenom vodom odstraniti saliviu iz podložene proteze. Osušiti dunajem vazduha.
2) Naneti sredstvo za premaz na podložene površine proteze. Sredstvo za premaz dobro osušiti duvanjem vazduha ili ostaviti stajati 4-5 minuta. Važno :
Za poboljšanje vrlčnog prijanjanja sredstvo za premaz također se može naneti na spoj sredstva GC TISSUE CONDITIONER i proteze.
3) Protezu ponovno postaviti u usta.
Važno :
a) Uranjanje proteze u vodu pre postavljanja u usta smanjiće neugodan miris.
b) Pacijentu pokazati kako se prstima pod tečnom vodom čiste podložena područja. Korišćenje četkice može oštetiti podložena područja. Treba paziti da se sredstva za čišćenje proteze ne koriste duže vreme.
6. ODSTRANJIVANJE
Preporučuje se odstraniti materijal ili ga zameniti novim posle nekoliko dana ili nedelja zavisno o svakom kliničkom slučaju.
GC TISSUE CONDITIONER može se odstraniti ručno.
Ostrim instrumentom ili borerom odstraniti područje gde je korišćeno sredstvo za premaz kao sredstvo za spajanje.

**ČUVANJE**
Za optimalno korišćenje preporučuje se čuvati na hladnom i tamnom mestu (4-25°C) daleko od direktne sunčeve svetlosti i visoke temperature.

**BOJE**
Žarko roza, bela

**PAKIRANJA**
1. 1-1 pakovanje
Komplet sadrži: prah 90 g (1), tečnost 90 g (101 mL) (1), Sredstvo za premaz 12 g (15 mL) (1), merica za prah (1), plastični špric za tečnost br. 1 (1), četkica br. 7 (1), plastična špatula (1), gumena čaša (velika) (1)
2. Pakovanje za dopunu
a. GC TISSUE CONDITIONER prah 90 g (u svakoj boji)
b. GC TISSUE CONDITIONER tečnost 90 g (101 mL)
c. GC TISSUE CONDITIONER sredstvo za premaz 12 g (15 mL)

**UPOZORENJE**
1. Tečnost je zapaljiva. Izbegavati izvore paljenja. Ne čuvati niti koristiti u blizini vatre ili visoke temperature.
2. Koristiti u dobro provetrenom prostoru. Odmah ponovo poklopiti.
3. Izbegavati dodir sa očima. U slučaju dodira, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
4. Izbegavati direktnan dodir tečnosti, mešavine ili sredstva za premaz sa kožom. U slučaju dodira obrisati komadićem vate ili sunđerom namočenim u alkohol i isprati vodom.
5. Sredstvo za premaz može sa vremenom da počuti, ali to ne utiče na funkciju.
6. Ne mešati sa drugim proizvodima.
7. U retkim prilkama lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite z uporabo izdelka in napotite pacienta k zdravniku.
8. Osetna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati.

Nekateri proizvodi omenjeni v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasificirani kot nevarni glede na GHS. Vedno se podučite o navodilih za varno uporabo na:
http://www.gceurope.com
Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni kontaminaciji med pacientom in sistemom za večkratno uporabo, je zahtevana dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi pregleje sistem za večkratno uporabo in označite poškodbe če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito očistite sistem za večkratno uporabo, da preprečite sušenje in nabiranje nečistoče. Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri zdravstvenih inštitutih skladno z regionalno/lokalno regulativo.

Poročilo o nezelenih učinkih:
Če se zavedate kakršnih koli nezelenih učinkov, reakcij ali podobnih dogodkov, do katerih je prišlo pri uporabi tega izdelka, vključno s tistimi, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, jih prijavite neposredno prek ustreznega sistema za stalni nadzor, tako da izberete ustrezen organ v vaši državi dostopni preko naslednje povezave:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
kot tudi v našem sistemu notranjega nadzora: vigilance@gc.dental
Na ta način boste prispevali k izboljšanju varnosti tega izdelka.

Zadnja izdaja: 08/2019

Пре употребе пажљиво прочитати упутство. SR

# GC TISSUE CONDITIONER

МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНДИЦИОНИРАЊЕ ТКАНИНЕ И ПОДЛАГАЊЕ ПРОТЕЗЕ

Само за стручну стоматолошку употребу у прописаним индикацијама.

**ПРЕПОРУЧЕНЕ ИНДИКАЦИЈЕ**
1. Кондиционирање ткива.
2. Привремено подлагање протеза.
3. Узимање функционалног отиска.

**КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ**
Немојте користити овај производ код пацијената са познатим алергијама на метакрилатни мономер, метакрилатни полимер, етанол или алифатске киселине на бази естера алифатске киселине.

**УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ**
1. ПРЕПАРАЦИЈА
Проверити оралну стање пацијента и протезе коју користи. Карбидним борером прилагодити подлагања добро не пристају, очистити і осушити. Остварити довољно простора за наношење материјала GC TISSUE CONDITIONER у слоју минималне дебљине 1 мм како би се одржала еластичност.
На места где се треба подлагати протезу нанеті COCOA BUTTER ili vazelin.
2. ДОЗИРАЊЕ ПРАХ / ТЕЧНОСТ
Стандардни однос прах / течност износи 2,4 g / 2 mL (1 порција праха на 2 једниче течности). Потребне количине праха і течности дозирати у гумену чашу.
Напомена:
a) Ако користите мању течност изазваће краћу фазу гелаste конзистенције і вискознију мешавину. Ако течност изаберете дужу фазу гелаste конзистенције і мање вискозну мешавину.
b) У појединим условима складиштења прах може да се згрудва. Ово не утиче на функцију.
c) Одмах по отварању затворите стаклене бочице, мешавине ili sredstva za premaz.
3. МЕШАЊЕ
Прах і течност мешати 30-60 секунди док мешавина не постане кремаста.
4. НАНОШЕЊЕ
1) Средство за премаз може се користити као средство за спајање за побољшање čvrstoće spoja і izbegavanje odvajanja sloja. Средство за премаз нанеті четкицом само на подручја где је потребан čvršći spoj. У том случају GC TISSUE CONDITIONER не може се одстранити ручно.
2) Мешавину равномерно нанеті на површине за прилањање prepariane proteze.
Важно :
a) Како би се избегло лепљење материјала, прсти или инструмент треба навлажіті водом. Не користіті лосион ili vazelin.
b) Пазіті да не слије у грло.
3) Протезу поставіті у уста. Пацијенту замоліті да нежно затвори уста у centričnoj okluziji і повуче усне і образе тако да их обликују мишићима. Протезу држати у том положају 5 минута, скинуті је і проверіті има ли вишка материјала или недостатка.
4) Одстрим инструментом одстранити вишак материјала.
5. ЗАВРШНА ОБРАДА
1) Под текућом водом одстранити саліви із подложене протезе. Осушіті дувањем ваздуха.
2) Нанеті средство за премаз на подложене површине протезе. Средство за премаз добро осушіті дувањем ваздуха ili оставіті стајаті 4-5 минута.
Важно :
За побољшање вірчиног пријањања средство за премаз такође се може нанеті на spoj sredstva GC TISSUE CONDITIONER і протезе.
3) Протезу поновно поставіті у уста.
Важно :
a) Уранјање протезе у воду пре постављања у уста смањіће неугодан мирис.
b) Пацијенту показаті како се прстима под текућом водом чисте подложена подручја. Коришћење четкице може оштетіті подложена подручја. Треба пазіті да се средстава за чишћење протеза не користе дуже време.
6. ОДСТРАЊИВАЊЕ
Препоручује се одстранити материјал ili га заменіті новим после неколіко дана ili недеља зависно о сваком клиничком случају.
GC TISSUE CONDITIONER може се одстранити ручно.
Оштрим инструментом ili борером одстранити подручје где је коришћено средство за премаз као средство за спајање.

**ЧУВАЊЕ**
Препоручује се одстранити материјал ili да замениті новим после неколіко дана ili недеља зависно о сваком клиничком случају.
GC TISSUE CONDITIONER може се одстранити ручно.
Оштрим инструментом ili борером одстранити подручје где је коришћено средство за премаз као средство за спајање.

**ЧУВАЊЕ**
Препоручује се чувати на хладном і тамном месту (4-25°C) далеко од директне сунчеве светлості і високе температуре.

**БОЈЕ**
Жарко роза, бела

**ПАКОВАЊА**
1. 1-1 паковање
Комплет садржі: прах 90 g (1), течност 90 g (101 mL) (1), Средство за премаз 12 g (15 mL) (1), мерица за прах (1), пластічні špric za течност br. 1 (1), четкица br. 7 (1), пластічна špatula (1), гумена чаша (велика) (1)
2. Паковање за допуну
a. GC TISSUE CONDITIONER прах 90 g (у свакој боји)
b. GC TISSUE CONDITIONER течност 90 g (101 mL)
c. GC TISSUE CONDITIONER средство за премаз 12 g (15 mL)

**УПОЗОРЕЊЕ**
1. Течност је запаљива. Избегавати изворе паљења. Не čuvati niti koristiti u blizini vatre ili visoke temperature.
2. Користіті у добро проветреном простору. Одмах ponovo poklopiti.
3. Избегавати додір са очима. У случају додира, одмах исправі vodom і потражіті лекара.
4. Избегавати директнан додір течності, мешавине ili sredstva za premaz sa kožom. У случају додира обрисаті комадићем вате ili sunđerom намоченим у алкохол і исправі vodom.
5. Средство за премаз може за времењем да почне, али то не утиче на функцију.
6. Не мешаті са другим производима.
7. У ретким ситуацијама свој производ може изазвати осетљивост код неких особа. У случају такве реакције треба прекінуті за употребом производа і обратіті се лекару.
8. Лична заштітна средства, као што су рукавице, маска за лице і sigurnosna zaštita za oči, треба увек носіті.

Неки производи поменуті у овом Упутству за употребу могу да се класификују као опасні према GHS. Увек проверіте у sigurnosno tehničkom listu na:
http://www.gceurope.com
Такође su dostupni код вашег добављача.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla kontaminacija između pacijenta ova višekratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe pregledati višekratno upotrebljivo pakovanje i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećenu sprvau baciti.
NE URANJATI U TEČNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljno očistiti višekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje prljavštine. Dezinfikovati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema registrovanoj zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalno/nacionalnim smernicama.

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, odabirom odgovarajuće autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ka i na naši interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Poslednja revizija: 08/2019

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання. UK

# GC TISSUE CONDITIONER

МАТЕРІАЛ ДЛЯ КОНДИЦІЮВАННЯ ТКАНИН РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ДЛЯ ПЕРЕБАЗУВАННЯ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

**ПОКАЗАННЯ**
1. Кондиціювання тканин ротової порожнини.
2. Тимчасове перебазування.
3. Зняття функціональних відбитків.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ**
Не використовуйте цей матеріал для пацієнтів з алергією на мономер метакрилата, полімер метакрилата, етанол або пластифікатор на основі ефіру аліфатичної кислоти.

**ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ**
1. ПІДГОТОВКА
Перевірте стан ротової порожнини пацієнта та протезної конструкції, яку використовує пацієнт. Підготовіть твердотканинне фрезою ділянки, що не прилягають, почистіть їх та просушіть. Забезпечте утворення достатнього місця для нанесення шару GC TISSUE CONDITIONER товщиною мінімум 1 мм для отримання необхідної еластичності. Нанесіть кокосове масло або вазелін на поверхні, що не призначені для перебазування.
2. ДОЗУВАННЯ ПОРОШКУ/РІДИНИ
Стандартне співвідношення порошку і рідини - 2,4 г / 2 мл (одна порція порошку до 2 порцій рідини). Відміряйте потрібну кількість порошку та рідини у гумову чашку для замішування.
Примітки :
a) Використання меншої кількості рідини призведе до скорочення гелеподібної фази та утворення сумші більшої в'язкості. Більша кількість рідини призведе до подовження гелеподібної фази та утворення сумші меншої в'язкості.
b) За певних умов зберігання порошок в пляшечці може частково злипатися. Це не впливає на робочі властивості матеріалу.
c) Щільно закривайте пляшечки з порошком, рідиною та покривним лаком одразу після використання.
3. ЗАМІШУВАННЯ
Замішуйте порошок з рідиною протягом 30-60 секунд доки суміш не набуде кремоподібної консистенції.
4. НАНЕСЕННЯ
1) Покривний лак може бути використаний у якості бондингового агенту для покращення зв'язування та уникнення можливого відшарування. За допомогою пензлика нанесіть покривний лак лише на місця, де необхідне посилення адгезії. У цьому випадку GC TISSUE CONDITIONER буде неможливо видалити руками.
2) Рівномірно нанесіть суміш на поверхні підготовленого протезу, що прилягають до перебазуванню.
Примітка :
a) Для запобігання налипання матеріалу зволожте пальці або інструмент водою. Не використовуйте крем або вазелін.
b) Уникайте потрапляння надлишків матеріалу у горло пацієнта.
3) Встановіть протез у роті. Попросіть пацієнта легка прикусити його у положенні центральної оклюзії і поворушити губами та нижньою щелепою для надання матеріалу потрібної форми. Через 5 хвилин вийміть протез та перевірте наявність надлишків матеріалу та місць, куди він не потрапив.
4) Видаліть надлишки гострим інструментом.
5. ФІНІШНА ОБРОБКА
1) Промийте протез від слини під проточною водою. Висушіть повітрям.
2) Нанесіть покривний лак на поверхні протезу, які були перебазовані. Ретельно висушіть його повітрям або просто залиште на 4-5 хвилин.
Примітка :
Для покращення крайового прилягання покривний лак можна також нанести на стик GC TISSUE CONDITIONER та протеза.
3) Повторно встановіть протез у ротову порожнину.
Примітка :
a) Для зменшення неприємного запаху перед встановленням занурте протез у воду.
b) Проінструктуйте пацієнта, що очищення перебазованих ділянок протеза потрібно здійснювати пальцями під проточною водою. Використання щітки може пошкодити перебазовані ділянки. Насильницьке можливо, слід утримуватись від застосування спеціальних речовин для чистки протеза протягом тривалого часу.
6. ВИДАЛЕННЯ
Рекомендується видалити або замінити матеріал через кілька днів або тижнів, в залежності від клінічного випадку. GC TISSUE CONDITIONER можна зняти вручну.
Використовуйте гострий інструмент або бор для видалення матеріалу з ділянок, де застосовувався бондинговий агент.

**ЗБЕРІГАННЯ**
Для оптимальних робочих характеристик зберігати у прохолодному та темному місці при температурі 4-25°C (39,2-77,0°F) подалі від прямих сонячних променів та високої температури.

**КОЛЬОРИ**
Рожевий, Білий

**УПАКОВКА**
1. 1-1 Упаковка
Набір містить: Порошок 90г (1), Рідина 90г (101мл) (1), Покривний лак 12г (15мл) (1), Мірна ємність для порошку (1), Пластиковий шприц для рідини №1 (1), Пензлик №7 (1), Пластиковий шпатель (1), Гумова чашка (Велика) (1)
2. Додатково
a. GC TISSUE CONDITIONER порошок 90г (кожного відтінку)
b. GC TISSUE CONDITIONER Рідина 90г (101мл)
c. GC TISSUE CONDITIONER покривний лак 12г (15мл)

**УВАГА**
1. Рідина є легкозаймистою. Не тримайте поблизу джерел займання. Не зберігайте та не використовуйте біля відкритого вогню чи за умов високої температури.
2. Використовуйте у приміщеннях, що добре провітрюються. Після використання негайно закривайте кришечкою.
3. Уникайте контакту з очима. При потраплянні у очі негайно промийте водою та зверніться до лікаря.
4. Уникайте прямого контакту рідини, суміші та покривного лаку зі шкірою. У випадку такого контакту видаліть матеріал ватною кулькою або губкою, змоченими у спирті та промийте водою.
5. Покривний лак може поколоти з часом, але це не впливе на його робочі властивості.
6. Не змішуйте з іншими матеріалами.
7. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.
8. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.

Деякі зі згаданих у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути класифіковані як небезпечні згідно з GHS. Завжди ознайомлюйтеся з паспортами хімічної безпеки продуктів, які можна завантажити за наступним посиланням:
http://www.gceurope.com
Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого постачальника.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ:
СИСТЕМИ ДОСТАВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ: з метою запобігання перехресному інфікуванню пацієнтів ці системи вимагають дезінфекції середнього рівня. Одразу після використання перевіряйте їх стан. Не використовуйте у разі пошкодження.
НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У ДЕЗИНФІКУЮЧІ РОЗЧИНИ. Ретельно очистіть систему, щоб попередити засихання та накопичення забруднень. Продезінфікуйте її дезінфікуючим засобом для середнього рівня дезінфекції, який зареєстрований в установах охорони здоров'я відповідно до регіональних/національних вимог.

Небажані ефекти – Звітність
Якщо ви дізнаєтеся про будь-які небажані наслідки, реакції або подібні випадки, що виникли внаслідок використання цього продукту, включаючи ті, що не зазначені в цій інструкції щодо використання, будь ласка, повідомте про них безпосередньо уповноваженому представнику виробника в Україні за наступним посиланням:
info@kristar.ua
а також до нашої системи внутрішнього контролю: vigilance@gc.dental
Таким чином, ви будете сприяти підвищенню безпеки цього продукту.

Останні зміни внесено: 08/2019

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРІСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

Kullanmadan önce, talimatları dikkatlice okuyunuz. TR

# GC TISSUE CONDITIONER

DOKU ŞARTLAYICI VE BESLEME MATERYALİ

Sadece diş hekimleri ve diş teknisyenleri tarafından önerilen endikasyonlarda kullanılır.

**TAVSİYEDİLEN ENDİKASYONLAR**
1. Doku Şartlayıcı
2. Geçici Besleme
3. Fonksiyonel Ölçü Alma

**KONTRAENDİKASYONLARI:**
Bilinen metakrilat monomer , metakrilat polimer, etanol veya alifatik asit ester bazlı plastikleştirici alerjisi olan hastalarda bu ürünün kullanımından kaçınılmalıdır.

**Kullanma Talimatı**
1. HAZIRLIK
Hastanın oral durumunu ve kullandığı protezin durumunu kontrol ediniz. GC TISSUE CONDITIONER 'ın uygulanacağı, yeterince elastikiyeti sağlayabilmek için en 1 mm kalınlığında boşluk elde ediniz. Beslemenin gelmesini istemediğiniz yerlere kakao yağı veya vazelin uygulayınız.
2. TOZ/LİKİT TAŞIMA
Standart toz / likit oranı 2,4 g/2 mL (1 birim toz ve 2 birim likitir). Gerekli miktarda toz ve likiti plastik kaba koyunuz.
Not :
a) Daha az likit kullanmak, daha kısa jel fazı ve daha viskoz bir karışım ile sonuçlanacaktır. Daha fazla likit kullanmak ise daha uzun jel fazı ve daha az viskoz bir karışım ile sonuçlanacaktır.
b) Toz şişede belli koşullarda toplar haline gelebilir. Bu durum fonksiyonu etkilemez.
c) Toz, likit ve örtücü ajanın şişesini kullanımdan hemen sonra sıkıca kapatınız.
3. KARIŞTIRMA
Karışım krem kıvamına ulaşıncaya kadar 30-60 saniye toz ve likiti karıştırınız.
4. UYGULAMA
1) Örtücü ajan, bağlantı kuvvetini artırmak ve tabakalanmayı önlemek için bağlayıcı ajan olarak kullanılabilir. Güçlü bağlanmanın gerekli olduğu bölgelere fırça ile örtücü ajanı uygulayınız. Bu durumda GC TISSUE CONDITIONER el ile soyulamaz.
2) Hazırlanan protezin oturma noktalarına karışımı düzgünce uygulayınız.
Not :
a) Materyalin parmak ucuna veya aletlere yapışmasını önlemek için bu ve islatınız. Losyon veya vaselin kullanmayınız.
b) Fazlalıkların boğaza kaçmasını önleyin.
3) Protezi ağıza oturtun. Hastaya hafifçe merkezi okluzyonda, ağzını açıp kapamasını ve kas hareketleri ile dudakların ve manıdbuların düzeltmesini söyleyin. Hastayı bu pozisyonda 5 dakika beklettikten sonra protezi ağızdan çıkarınız ve fazlalıkları vb. kontrol ediniz.
4) Keskin bir alet kullanarak fazlalıkları uzaklaştırınız.
5. BİTİRME
1) Akan suyun altında tükürükleri besleme yapılmış yüzeyden uzaklaştırınız. Hava girişinizi ile kurutunuz.
2) Besleme yapılmış damak yüzeyine örtücü ajanı uygulayınız. Hava şırıngası ile kurutunuz ve 4-5 dakika dokunmadan bekleyiniz.
Not :
Marjinal Örtücülüğü artırmak için örtücü ajan, GC TISSUE CONDITIONER ıdamak arayüzlerine de sürülür.
3) Protezi tekrar ağıza oturtunuz.
Not :
a) İstemeyen kokuyu önlemek için protezi ağıza oturtmadan önce suya daldırınız.
b) Protezi temizlemek için beleme yapılmış bölgeleri sadece parmak ucu ile değiştirmek üzere veya tamamen çıkarmak üzere çıkarılabilir. GC TISSUE CONDITIONER el ile soyulabilir. Bonding ajanın uygulandığı yerler keskin bir aletle veya frez ile çıkarılabilir.

**SAKLAMA**
Optimum performans için; Yüksek sıcaklık ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. (4-25 °C / 39.2-77.0 °F)

**RENKLER**
Canlı Pembe, Beyaz

AMBALAJ
1. 1-1-Paket Kit İçeriği:
Toz 90 gr (1)x Likit 90 gr(101 mL)(1),
Örtücü Ajan 12 gr (15 mL)(1), Toz Ölçeği(1) Plastik Likit Şırıngası no:1(1), Fırça No:7(1), Plastik spatül(1), Lastik Kap(geniş) (1)
2. Refil Paket
a. GC TISSUE CONDITIONER toz 90 gr( her renkte)
b. GC TISSUE CONDITIONER likit 90 gr(101 mL)
c. GC TISSUE CONDITIONER örtücü ajan 12 gr (15mL)

**Uyarılar:**
1. Likit yanıcıdır. Patlayıcı kaynaklardan sakının. Ateşe ve yüksek sıcaklığa yakın yerlerde kullanmayınız ve saklamayınız.
2. İyi havalanmış yerlerde kullanınız. Kapağını hemen kapatınız.
3. Göz ile temasından sakının. Gözle temas ettiğinde derhal bol su ile yıkayın. ve tıbbi yardım alın.
4. Deriyle likit, örtücü ajan ve karışımın temasından sakının. Temas halinde pamukla temizleyip, su ile yıkayınız.
5. Örtücü ajan zamanla sarı renge dönüşebilir, bu fonksiyonunu etkilemez.
6. Diğer ürünler ile karıştırmayınız.
7. Metakrilata karşı bilinen hassasiyeti olan hastalarda kullanmayın. Alerji durumunda bir uzman hekime başvurun.
8. Daima eldiven, yüz maskesi ve güvenlik gözlüğü gibi kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) takılmalıdır.

Önceki kullanıma kılavuzunda refere edilen bazı ürünler GHS'e göre zararlı sınıflandırılabilir. Daima kendinizi aşağıdaki linkte mevcut olan güvenlik bilgi pusulalarına alışabilirsiniz.
http://www.gceurope.com
Aynı zamanda tedarikçiden elde edilebilir.

TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON:
ÇOK-KULLANIMLIK DAĞITICI SİSTEM: Hastalar arasında çapraz kontaminasyonu önlemek için bu cihaz orta-seviye dezenfektan gerekmektedir. Kullanımdan hemen sonra cihazı gözlemleyin ve bozulma için etiketleyin. Eğer zarar görmüşse cihazı çöpe atın.
SUYA DALDIRMAYINIZ. Kurumasını ve kontaminasyonun akümülasyonu nu önlemek için tamamen cihazı temizleyiniz. Orta-seviye kayıtlı sağlık bakım-derecesi enfeksiyon kontrol ürünü ile bölgesel / ulusal rehberelere uygun olarak dezenfekte ediniz.

İsten